



CIRCOLARE N.2/2020

Situazione Varroa

Nell'annata in corso, complice il clima mite invernale, la deposizione della covata è iniziata molto presto, in alcune zone essa può datarsi alla prima settimana di gennaio.

A fine marzo abbiamo fatto dei test di monitoraggio su alcune famiglie in collaborazione con Vita Europe e la caduta di varroa è stata significativa considerato il periodo e il numero di favi con covata opercolata.

Conteggio acari	gruppo apistan (1 striscia per 15 gg) + apiguard (2 confezioni)						Conteggio acari	gruppo apistan (1 striscia per 30 gg)						Conteggio acari	gruppo apiguard (2 confezioni)						Conteggio acari	gruppo testimone senza trattamento (caduta naturale)					
	data	A1	A2	A3	A4	A5		A6	data	B1	B2	B3	B4		B5	B6	data	C1	C2	C3		C4	C5	C6	data	D1	D2
18-mar	28	21	39	34	13	31	18-mar	6	9	13	7	11	16	18-mar	12	22	17	14	7	15	18-mar	4	7	2	5	1	9
19-mar	16	8	27	19	10	9	19-mar	8	11	17	20	14	5	19-mar	15	11	8	11	18	23	19-mar	2	4	5	3	0	4
22-mar	7	4	11	8	2	3	22-mar	4	5	3	5	2	3	22-mar	6	5	7	10	4	9	22-mar	1	3	2	6	2	2
27-mar	17	13	23	14	7	11	27-mar	9	12	5	7	3	5	27-mar	0	3	0	1	6	2	27-mar	0	1	3	2	0	1
2-apr	10	11	4	9	7	6	2-apr	5	6	3	5	2	5	2-apr	2	5	3	4	6	8	2-apr	5	1	3	5	2	4
7-apr	14	9	24	6	5	8	7-apr	7	9	6	8	9	4	7-apr	24	39	31	41	19	43	7-apr	6	4	5	8	3	2
14-apr	12	19	27	14	11	5	14-apr	8	11	9	7	3	2	14-apr	10	14	12	14	4	17	14-apr	4	2	4	2	5	6
18-apr	3	6	2	2	3	4	18-apr	4	8	3	2	4	7	18-apr	3	0	7	4	2	2	18-apr	0	3	6	0	2	4
totale	107	91	157	106	58	77	totale	51	71	59	61	48	47	totale	72	99	85	99	66	119	totale	22	25	30	31	15	32

Nella metà di maggio sono stati trattati con ossalico (apibioxal®) dei nuclei con regina appena fecondata (cella sfarfallante ultimi giorni di aprile), mediamente la caduta di varroe si è attestata oltre le 250 unità.

Cosa fare? Entro i primi 10 gg di giorni di giugno si consiglia il trattamento con ossalico (apibioxal), anche su tutte le famiglie.

Non importa se ovviamente c'è covata e il trattamento viene consigliato in assenza della stessa, è l'unico modo per abbassare l'infestazione e poter arrivare al trattamento estivo con più tranquillità.

Osservare la caduta dopo 5 gg, se essa supera le 100 unità il trattamento estivo dovrà rigorosamente essere iniziato entro la metà di luglio.

Piano di lotta 2020

Ribadiamo in concetto già espresso in precedenza, dopo anni e anni di prove di campo e risultati confortanti con l'utilizzo di abbinate tra due principi attivi con tempo di carenza zero e acquistabili senza ricetta, a livello nazionale qualche veterinario lungimirante ha sollevato il problema che Apistan® e timoli o Apivar® e timoli non possono essere utilizzati insieme, in quanto l'etichetta non prevede l'utilizzo in abbinata.

Pertanto nel 2020 si dovrà procedere con l'inserimento dei timoli e solo successivamente con l'inserimento del Apistan® o Apivar® (combinata)



Per il 2020 il Consorzio ha deciso di proporre (Apistan®) in stretto combinata (prima i timoli e poi le strisce) con i timoli Apilife Var® o Apiguard®.

Contemporaneamente si inizia il trattamento con i timoli.

- a) Combinata Apistan® + Apilife Var® (2 strisce di Apistan® + 2 confezioni di Apilife Var)
ogni confezione di Apilife Var® contiene 2 tavolette, si utilizza 1 sola tavoletta per ogni inserimento.
La tavoletta va divisa in 4 parti uguali e posizionata agli angoli come indicato sotto, preferibile avvicinare di 3- 4 cm verso il centro le tavolette.



Il trattamento con Apilife Var® va ripetuto per 4 volte ogni 6/7 giorni.
Le strisce di Apistan® vanno tenute dentro per 6 settimane

- b) combinata Apistan® + Apiguard® (2 strisce di Apistan® + 2 vaschette di Apiguard®)
La vaschetta di Apiguard® va posizionata in centro, la seconda vaschetta si inserisce dopo 12 gg, lasciando pure dentro la prima che può avere ancora un po di principio attivo.

Il socio pertanto potrà ritirare il medicinale spettante dalla denuncia alveari al 31/12/2019 a partire da sabato 9 giugno; invitiamo tutti a rispettare il periodo indicato in modo da consentire la successiva rendicontazione alla direzione regionale agricoltura.

Ogni socio riceverà per ogni alveare denunciato due confezioni di medicinale in funzione del piano prescelto, la terza confezione (o striscia aggiuntiva) è a pagamento (esempio: nel caso di un trattamento completo con Apistan® e timoli, apicoltore riceverà due strisce Apistan® mentre i timoli saranno conteggiati a prezzo di costo come quota integrativa).

Nel caso in cui l'associato richiedesse medicinale eccedente il numero di alveari denunciati, entrambe le confezioni dovranno essere pagate al prezzo sottoindicato:

Apilife Var: il prezzo a singola confezione è di 1,80 €

Apiguard: il prezzo a singola confezione è di 2,00 €

Apistan: prezzo a striscia 2,00

Il medicinale verrà consegnato solo a coloro che risultano in regola con il pagamento delle quote associative 2020



Il fenomeno della REINFESTAZIONE

La reinfestazione è una delle situazioni ricorrenti negli ultimi 15 anni.

Alveari trattati in ritardo o non trattati bene sono fonti di inoculo per chi invece si dedica meticolosamente alla cura delle sue api.

Un'ape svernante parassitizzata da varroa a fine settembre riduce la propria vitalità del 90%.

La frase ricorrente tra di noi è la seguente "non si capisce perché sono morte...è pieno di scorte".

Per limitare il danno da reinfestazione che porta quasi sempre ad una mortalità elevata è necessario intervenire già a settembre.

Entro la prima decade di settembre si consiglia un trattamento con ossalico o l'inserimento di una striscia di con Apivar®, quest'ultimo si terrà all'interno del alveare per 8 settimane e consentirà di limitare gli effetti della reinfestazione

La formazione delle api invernali

Gli spopolamenti che da anni si osservano nei mesi autunnali sono riconducibili a due fattori:

- trattamento tardivo contro la varroa;
- reinfestazione a settembre;
- api deboli con corpo grasso non formato.

Laddove NON c'è presenza di apporto pollinico (edera, topinambur ecc..) diventa fondamentale la nutrizione proteica e glucidica di fine agosto.

Il trattamento con Apiherb e con altri nutraceutici (Vita Bee Patty e Vita Bee Power) a fine agosto

Negli ultimi anni numerose prove di campo hanno dimostrato i buoni risultati nell'utilizzo di Apiherb®.

Favorisce la formazione del tessuto di riserva (corpo grasso) che permette di immagazzinare prodotti alimentari elaborati (digeriti) e renderli disponibili all'organismo in momenti difficili (avversità climatiche - invernamento), garantendo così una maggiore longevità dell'ape. E' molto importante nella fase larvale; una larva sottoalimentata non da origine ad un'ape matura normale

Oltre che nella modalità sgocciolato come indicato in etichetta è possibile miscelare apiherb nello sciroppo.

Modalità sgocciolato: sciogliere una busta di apiherb in 500 ml di sciroppo al 50% (se sciroppo commerciale al 65 o 70% va bene ugualmente).

Distribuire 5 ml di prodotto per interfavo.

Ripetere il trattamento per 3 o anche 4 volte ogni settimana.

Quando iniziare il trattamento? Nella terza decade di agosto e proseguire fino a metà settembre.

È possibile utilizzare Apiherb® nello sciroppo nella dose di 2 g per litro.

Pertanto nell'alimentazione di fine agosto è settembre per ricostituire le scorte è consigliabile l'utilizzo di questo integratore.

(il consorzio NON distribuisce direttamente il prodotto Apiherb® o altri prodotti, sarà cura della segreteria fornire ulteriori informazioni)



Nuova sede operativa del Consorzio

La nuova sede si trova a Fogliano in Via San Michele 11 “ex Municipio” di Fogliano Redipuglia.

Orario dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (solo il sabato)

A partire dal 6 giugno e fino a sabato 25 luglio l'orario subirà una integrazione con l'apertura infrasettimanale nella giornata di martedì:

- martedì dalle 16.00 alle 19.00

- sabato dalle 9.30 alle 12.30

Questo per consentire la distribuzione dei medicinali.

Quota associativa 2020

La quota associativa relativa all'anno 2020 è vincolata alla distribuzione dei medicinali per l'anno in corso che il Consorzio deve acquistare a partire dal mese maggio e distribuire entro la fine di luglio per gli obblighi di rendicontazione derivanti dal Reg.Ue 1308/2013

Quota associativa: euro 50,00

Quota ad alveare: euro 2,5 comprensivo di parte del trattamento base contro la varroa (vedi piano di lotta 2020)

La quota associativa garantisce una copertura assicurativa verso terzi, l'assistenza tecnica e sanitaria operata dagli esperti apistici, la distribuzione del medicinale, la rivista e non da ultimo garantisce continuità nelle attività associative.

È possibile scaricare tutta la modulistica direttamente dal nostro sito internet o compilarla direttamente presso la segreteria del Consorzio.

Il versamento può essere effettuato su conto corrente bancario intestato a :

Consorzio Obbligatorio fra gli Apicoltori della Provincia di Gorizia

Banca di Credito Cooperativo di Turriaco - Filiale di Ronchi dei Legionari

codice IBAN: IT02C0890364630000000301312

Per poter beneficiare della distribuzione dei medicinali si invitano i soci a saldare la quota associativa entro il **30 giugno 2020** o al massimo contestualmente al ritiro del medicinale.

Il medicinale potrà essere ritirato **entro e non oltre il 25 luglio c.a**

Nuovi apiari e consistenza alveari (IMPORTANTE) – trasmissione annuale in banca dati

La denuncia di nuovi apiari deve essere registrata in banca dati entro 7 gg dalla costituzione (D.M 04.12.2009 articolo 7 comma 2).

Per tale adempimento ci si può rivolgere direttamente alla segreteria del consorzio apicoltori



CONSORZIO APICOLTORI GORIZIA - FVG

Via Staranzano 23 34077 Ronchi dei Legionari (GO) – E-mail: consgoapi@gmail.com– C:F: 80000960312

La denuncia annuale della consistenza degli alveari deve essere fatta entro il 31 dicembre di ogni anno (LR. 6/2016, ART.6) e allo stesso tempo l'aggiornamento in Banca dati Nazionale deve avvenire nel periodo compreso tra il 1 novembre e 31 dicembre di ogni annualità (indirizzo, coordinate geografiche e consistenza alveari per ogni apiario)

Delega al Consorzio per operare in BDNA

Per i nuovi iscritti e per coloro che non hanno ancora provveduto a compilare la delega è possibile scaricarla dal sito www.mielisenzaconfini.it, compilarla e consegnarla in originale alla segreteria del Consorzio oppure tutto può essere fatto.

Nel caso di apicoltori che abbiamo dato delega ad altri soggetti e possibile gestire la loro posizione; in questo caso l'apicoltore deve chiedere la cessazione della delega al soggetto e successivamente comunicare alla segreteria del Consorzio apicoltori di Gorizia la gestione della propria anagrafe.

Cartello obbligatorio BDNA (banca dati nazionale apistica)

È possibile ritirare presso la segreteria del Consorzio il cartello riportante il codice identificativo di ogni apicoltore rilasciato dall'ASL.

Tale cartello obbligatoriamente va apposto in ogni apiario.

Contestualmente potrà essere esposto il cartello previsto dalla legge regionale vigente in materia di identificazione degli apiari riportante tutti i dati dell'apicoltore, quest'ultimo NON sostituisce quello previsto dalla BDNA.

Ogni cartello plastificato ha un costo di 1 euro.

Si chiede di preavvisare la segreteria prima di procedere al ritiro in modo tale di fare preparare i cartelli plastificati.

Fogliano Redipuglia 27 maggio 2020

Cordiali saluti

Il consiglio direttivo